

# SPARTAN

**Verbreitung:** weltweit, im Mostviertel wenig verbreitet



SPARTAN

## Sortenalter

1936

## Herkunft

Kreuzung aus McIntosh x Yellow Newton in Britisch-Kolumbien/Kanada

## Bes. Erkennungsmerkmale

dunkelrote Deckfarbe, bläuliche Bereifung, sehr tiefe Stielgrube, blumenartige Form des Bereichs zwischen Kerngehäuse und Leitbündeln, Fruchtfleisch unter der Schale rosa, rosa Gefäßbündel, Stielende knopfig

## Erntereife

Oktober

## Haltbarkeit

lang

## Verwendung

Frischverzehr

## FRUCHT:

**Fruchtgröße:** mittel

**Form:** kugelig, kugelig-kegelförmig, kurzkugelig-kegelförmig, flachkugelig, mittelbauchig; Querschnitt kantig, gleichhälftig

**Schale:** Oberfläche glatt; Grundfarbe grüngelb; Deckfarbe purpur, vollständig gefärbt, flächig; Schalenpunkte klein, wenig, rund; unauffällig umhoft; Bereifung bläulich; teilweise berostet, strahlenförmig um den Stiel, wenig in der Stielgrube

**Kelch:** geschlossen, Kelchblätter mittellang, getrennt; Kelchgrube tief, eng, Relief faltig, Rand rippig; Kelchhöhle kegelförmig, dreieckig, Sitz der Staubfäden unterhalb der Mitte

**Stiel:** holzig, kurz, dünn, gerade

**Kerngehäuse:** mittelständig, Kernfächer halbmondförmig, Ausblühungen schwach, Fruchtachse hohl, zu den Fächern geschlossen; Gefäßbündellinie zwiebförmig, mittig

**Fruchtfleisch:** weiß, rosa/rot, feinzellig, knackend; Geschmack süß, gering gewürzt; saftig

## BAUM:

**Wuchsform:** kugelig

**Blühbeginn:** früh

**Ertrag:** Massenträger

**Alternanz:** regelmäßig tragend