

ZUCCALMAGLIOS RENETTE

Synonyme: Von Zuccalmaglios Renette, Zuccalmaglio

Verbreitung: Österreich, Deutschland, im Mostviertel äußerst seltene Liebhabersorte



ZUCCALMAGLIOS RENETTE

Sortenalter

1878

Herkunft

Kreuzung aus Ananasrenette x Purpurroter Agatapfel durch Dietrich Uhlhorn jr. in Grevenbroich/Deutschland

Bes. Erkennungsmerkmale

kegelförmige, rundliche bis eiförmige Form, auffallende, braune Schalenpunkte auf gelber Grundfarbe mit orange bis rot angehauchter Deckfarbe, späte Reife

Erntereife

Oktober

Haltbarkeit

lang

Verwendung

Frischverzehr, Kochen

FRUCHT:

Fruchtgröße: mittel

Form: kugelig, kugelig-kegelförmig, kegelförmig, stumpf kegelförmig, oval, eiförmig, stielbauchig; Querschnitt rundlich, gleichhälftig

Schale: Oberfläche rau; Grundfarbe gelb, grüngelb; Deckfarbe orange, rot, verwaschen; Schalenpunkte groß, viele, sternförmig; Schalenpunkte oft unförmig und groß, manchmal auch grün, rund und klein, hell umhohft; Bereifung weiß; teilweise berostet, fleckig, strahlenförmig um den Stiel, kleine Rostfiguren, braun, um den Stiel wenig ausgedehnt

Kelch: geschlossen, Kelchblätter lang, verwachsen; Kelchgrube mitteltief, mittelweit, Relief faltig, Rand rippig; Kelchhöhle trichterförmig, Sitz der Staubfäden oberhalb der Mitte, Kelchröhre vorhanden

Stiel: holzig, kurz, mittellang, lang, mitteldick, gerade

Äußere Besonderheiten: teilweise erhabene, raue Schalenpunkte

Kerngehäuse: mittelständig, Kernfächer bogenförmig, Ausblühungen schwach, Fruchtachse hohl, zu den Fächern geschlossen; Gefäßbündellinie zwiebelförmig, mittig

Fruchtfleisch: gelblichweiß, feinzellig, mürbe; Geschmack ausgewogen, sauer, gering gewürzt; saftig

BAUM:

Wuchsform: pyramidal

Blühbeginn: spät

Ertrag: mittel

Alternanz: alternierend