

# ROTFLEISCHIGE MOSTBIRNE

**Synonyme:** Blutbirne, Mostputzer, Oberösterreichische Rotbirne, Rotbirne

**Verbreitung:** Nieder- und Oberösterreich, im Mostviertel selten zu finden



## ROTFLEISCHIGE MOSTBIRNE

### Herkunft

Oberösterreich

### Bes. Erkennungsmerkmale

flache Form, rotfleischig unter der Schale, rosa Wände des Kerngehäuses

### Genussreife

September, Oktober

### Haltbarkeit

kurz

### Verwendung

Most, Klärbirne

### FRUCHT:

**Fruchtgröße:** sehr klein, klein

**Form:** flachkugelig, Fruchtlänge sehr kurz, kelch-/mittelbauchig; Querschnitt rund regelmäßig, gleichhälftig

**Schale:** Oberfläche uneben; Grundfarbe grüngelb, schmutzig grüngelb, trüb/rotgrün; Deckfarbe trübröt, rot, marmoriert, verwaschen, punktiert, fleckig; Schalenpunkte vorhanden, fein, zahlreich, rot umhopt; Berostung graubraun, Rostflecken, Rostfiguren

**Kelch:** offen, groß, Kelchblätter sternförmig ausgebreitet; Kelchgrube mitteltief, weit, Relief glatt

**Stiel:** lang, mitteldick, in Stielgrube eingesteckt, gebogen, braun, an der Basis fleischig

**Kerngehäuse:** mittelständig, kugelförmig; Fruchtachse stark hohlachsig; Kammern groß; Samen zahlreich, gut entwickelt

**Fruchtfleisch:** gelblichweiß, rot, grobzellig, fest, saftig, kernweich, süß-säuerlich, herb, sehr herb, wenig gewürzt

### BAUM:

**Wuchsform:** kugelig, hochkugelig

**Blühbeginn:** früh

**Ertrag:** viel

**Alternanz:** ja